

# Acetato de megestrol



**Marca comercial:** Megace

**Clase de medicamento:** Infecciones oportunistas y otros

El acetato de megestrol, conocido también como Megace, es un tipo de medicamento llamado anticaquéctico. Estos productos hacen engordar al paciente.

## Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

El acetato de megestrol fue autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) el 10 de septiembre de 1993 para tratar el adelgazamiento excesivo causado por el SIDA. No cura la infección por el VIH ni el SIDA ni reduce el riesgo de transmisión del virus a otras personas.

## Presentación/Administración

Se fabrica en tabletas y en líquido. Puede tomarse con comida o solo.

## Contraindicaciones

Los pacientes deben informar al médico sobre cualquier problema de salud que tengan antes de tomar este medicamento.

## Posibles efectos secundarios

Además de sus efectos deseables, el acetato de megestrol puede causar algunos efectos adversos. Entre sus efectos adversos graves están hipertensión arterial, diabetes, inflamación de los vasos sanguíneos, insuficiencia cardíaca congestiva, convulsiones y neumonía. Los pacientes deben indicarle al médico si tienen síntomas de cualquiera de esos efectos secundarios.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo de este medicamento. Entre los efectos secundarios menos graves están diarrea, flatulencia, náusea, vómito, estreñimiento, pirosis, sequedad de la boca, aumento de la salivación y candidiasis bucal, impotencia, reducción del deseo sexual, frecuencia urinaria, incontinencia urinaria, infección de las vías urinarias, sangrado (incluso intermenstrual) y flujo vaginal, enfermedad del músculo cardíaco, palpitaciones, dolor y opresión en el pecho, edema, dificultad respiratoria, tos, dolor de garganta, afecciones pulmonares, respiración acelerada, insomnio, dolor de cabeza, debilidad, adormecimiento de alguna parte del cuerpo, confusión, convulsiones, depresión y alteración de la capacidad de raciocinio. Se debe informar al médico si esos efectos secundarios continúan o son molestos.

## Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

## Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian acetato de megestrol, visite el sitio web de AIDSinfo:

<http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba acetato de megestrol. Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español.

Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de [clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov) en <http://www.clinicaltrials.gov> para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Megestrol AND HIV infections.

## Fabricantes

Megestrol  
Bristol - Myers Squibb Co  
PO Box 4500  
Princeton, NJ 08543-4500  
(800) 321-1335

Megace  
Bristol - Myers Squibb Co  
PO Box 4500  
Princeton, NJ 08543-4500  
(800) 321-1335

Megace ES  
Bristol - Myers Squibb Co  
PO Box 4500  
Princeton, NJ 08543-4500  
(800) 321-1335

## Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

# Acetato de megestrol



## Para más información (cont.)

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: [http://aidsinfo.nih.gov/live\\_help](http://aidsinfo.nih.gov/live_help) De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este